


CIVETTA DELLE PALME



(Paradoxurus hermaphroditus)

È originario del sud-est asiatico, dall'Afghanistan fino all'Indocina e all'Asia insulare sud-orientale. È sempre più minacciato a causa della caccia sfrenata e non regolamentata per il pet trade, la produzione del kopi luwak e la carne.



NATURA	CATTIVITÀ
Abitudini	
<p>Vive in foreste temperate, tropicali e alluvionali, pian-tagioni e aree antropizzate. È un specie crepuscolare e notturna, di natura schiva. Durante il giorno riposa nelle cavità degli alberi e nelle fessure delle rocce.</p> <p>È un animale arboricolo e terricolo. Lo si può osservare camminare al suolo e arrampicarsi su alberi, alti e con dense chiome, e sportarsi su cavi, tubature e tetti.</p> <p>Un maschio ha un'area di movimento anche di 17 km² e compie lunghi spostamenti per la ricerca di cibo.</p>	<p>Il 76% del commercio Indonesiano interessa individui giovani, anche di 6-8 settimane e non ancora indipendenti dalle madri. La quasi totalità è catturata illegalmente in natura e il tasso di mortalità è molto alto.</p> <p>Sono tenuti in gabbie senza cibo né acqua, esposti al sole, feriti, disidratati e angosciati.</p> <p>La natura arboricola e notturna e il movimento sono totalmente inibiti negli sterili ambienti della cattività.</p>
Dieta	
<p>Onnivora, ma principalmente frugivora. Si nutre di bacche e frutti polposi (soprattutto di fichi e palme, ma anche mango, banana e papaya) e occasionalmente caccia roditori, uccelli, insetti, vermi e molluschi. Inoltre, predilige la linfa delle palme da zucchero e degli alberi di cotone.</p>	<p>Gli alimenti sono spesso adattati da diete commerciali studiate per altri animali e presentano apporti nutrizionali inadeguati per questa specie. Sovrappeso, obesità, pancreatite, lipidosi epatica e morte incorrono a causa di una dieta errata e ad alto contenuto energetico.</p>
Socialità	
<p>È una specie solitaria, elusiva e silenziosa, che usa marcature odorose per comunicare sul territorio con i conspecifici.</p>	<p>Nei mercati asiatici si possono trovare rinchiusi gruppi di 10 o più individui, costretti alla luce del sole, in totale visibilità e in prossimità forzata di altri animali (uccelli, lucertole, primati).</p>
Zoonosi	
<p>La civetta delle palme può essere fonte di rabbia, campilobatteriosi, toxoplasmosi, bartonellosi e infezioni intestinali da Enterocytozoon bieneusi, Giardia duodenalis e Echinostoma. Inoltre, l'intenso sfruttamento umano l'ha forse coinvolta nella diffusione all'uomo dei virus della Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS).</p>	